


لُرُومبوز وریدهای عمیقی



بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و خارگ

آموزش و پژوهش


واحد آموزش سلامت بیمارستان توحید جم

تأیید کننده: خانم دکتر فرحت (متخصص قلب و عروق)

منبع: پرستاری داخلی و جراحی، بروونر سودارت

آذر ماه ۱۴۰۱


تاریخ بازبینی بعدی: آذر ماه ۱۴۰۳



۸. تنظیم یک برنامه دارو درمانی جهت تعیین میزان و مدت زمان مصرف دارو پس از ترجیح.
۹. آزمایشات خون برای اندازه گیری زمان انعقاد خون را طبق دستور پزشک به طور منظم انجام بدهید.
۱۰. در صورت وجود درد ، تورم ، قرمزی ، گرمی و حساسیت اندام مبتلا در لمس هر چه سریع تر به پزشک معالج مراجعه کنید.
۱۱. سفتی و سردی اندام می تواند نشانه پیشرفت بیماری باشد.
۱۲. سیگار نکشید. زنانی که از داروهای استروژن-دار یا قرص‌های ضدبارداری استفاده می‌کنند، باید از کشیدن سیگار خودداری کنند.

درمان ترومبوز سیاهرگ عمیقی

۱. استراحت مطلق و عدم تمرین در این دوره که مدت زمان آن توسط پزشک متخصص تعیین می‌گردد.
۲. تجویز داروهای ضد انعقاد (هپارین و وارفارین) طبق نظر پزشک معالج.
۳. اندام مبتلا باید بالاتر از سطح قلب قرار گیرد.
۴. استفاده از جوراب‌های الاستیک که اندازه متناسب داشته باشد.




۵. جوراب‌ها بدون تاخوردگی و چروکیدگی پوشیده شوند.
۶. هنگام خواب، جوراب یا باند را بیرون بیاورید و قبل از برخاستن از بستر آن را بپوشید.
۷. رعایت برنامه‌هایی که باعث پیشگیری از بروز محدود ترومبوز وریدی عمیقی می‌گردد مانند: پیاده روی، نوشیدن آب و کاهش وزن

ترومبوز (لخته) وریدهای عمیقی

به معنای تشکیل لخته خونی در دیوارهای داخلی یک سیاهرگ عمیق است که معمولاً در پشت ساق پا یا جلوی ران به وجود می‌آید. پیشرفت بیماری ممکن است باعث مسدود شدن نسبی یا کامل عروق خونی گردد. جدیترین عوارض احتمالی آن آمبولی ریه است که به دنبال جدا شدن لخته و حرکت آن در مسیر جریان خون و انتقال به دستگاه گردش خون ریوی ایجاد می-گردد.

ترومبوز وریدی عمیقی


جریان خون



بروید.

علائم بیماری ترومبوز وریدهای عمیقی

حدود نیمی از بیماران مبتلا به ترومبوز وریدهای عمیقی تا زمانی که رگهای بزرگ و اصلی مسدود نشوند، هیچ علامتی ندارند. سایر علائم عبارتند از درد، تورم، قرمزی، گرمی، تب خفیف و برجسته شدن رگهای سطحی یا در صورتی که لخته به سمت ارگانها حرکت کرده باشد، ممکن است برحسب ارگان، علائم دیگری مثل تنگی نفس، تاری دید، نابینایی و از دست دادن هوشیاری یا فلنج اندامها و ... باشد.



اگر برای مدت زمان طولانی در یک جا نشسته‌اید و پاهایتان آویزان است، برای جلوگیری از ترومبوز وریدهای عمیقی، کمی راه

نکاتی در مورد استفاده از داروهای ضد انعقاد خون (وارفارین)

۱. در صورت نیاز، از ریش تراش برقی به جای تبغ استفاده شود.
۲. از مسواک نرم استفاده کنید.
۳. مصرف غذاهای پرچرب و سرشار از ویتامین k (کلم، پیاز، کاهو، اسفناج، شلغم، ماهی و جگر) را محدود نمایید؛ زیرا در جذب وارفارین تداخل ایجاد می‌کنند.
۴. کارت مصرف داروی ضد انعقاد را همیشه همراه داشته باشید.
۵. در صورت خونریزی از هر قسمت از بدن، مدفوع قیری و سیاه، سرگیجه، ضعف و بی حالی و رنگ پریدگی، خونریزی غیر طبیعی در سیکل‌های ماهیانه و کبدی غیر طبیعی به پزشک مراجعه نمایید.