

- ارسال کتبی لیست شاغلین از طرف امور کارکنان و یا امور مسافرت شرکت عملیاتی براساس برنامه تردد هفتگی به رئیس بهداشت و درمان منطقه
- مدیریت برنامه غربالگری کارکنان اقماری با ارزیابی سلامت در سامانه خود اظهاری
- افراد دارای علائم بالینی و یا مشکوک با تایید پزشک و امور اداری شرکت از حضور در منطقه عملیاتی بمدت یک هفته معاف شوند
- در صورت اخذ مجوز بازگشت به کار از واحد طب صنعتی ، اعزام به منطقه انجام میگردد (فلوچارت-FC-01-COV)
- اطلاعات ارسالی همراه با مشخص کردن مبادی حرکت به مناطق اقماری ، جزایر و سکودریائی یا خشکی (مسیر زمینی و یا هوایی و یا دریایی)



- تعیین محل های غربالگری در مبادی حرکت توسط بهداشت و درمان منطقه مشخص و به صورت کتبی به شرکت اعلام میگردد
- مرکز ایمن بهداشتی درمانی صنعت نفت و یا ساختمان های اداری شرکت مربوطه جهت ارزیابی سلامت
- برنامه ریزی شرکت جهت مراجعه شاغل ، ارزیابی پزشک و تریاژ وی
- ارزیابی سلامت و تکمیل صفحه اول « پرسشنامه تریاژ سریع کووید-۱۹ » ( فرم ۱۲ ) در مرکز ایمن بهداشت و درمان صنعت نفت
- ارائه گواهی سلامت توسط پزشک ، یک روز قبل از تاریخ بوکینگ شاغل



- تایید بوکینگ ( پرواز، شناور و یا اتوبوس) از طریق امور مسافرت شرکت مربوطه **صرفاً** جهت افرادی که گواهی سلامت دریافت کرده اند
- توصیه می گردد از پروازهای چارتر صنعت نفت / اتوبوس ویژه افراد **دارای گواهی سلامت** استفاده گردد
- تحویل « پرسشنامه تریاژ سریع کووید-۱۹ » به فرد شاغل (فرم ۱۲)



- **در مقصد :** ارائه « پرسشنامه تریاژ سریع کووید-۱۹ » به واحد سلامت کار در منطقه ( فرم ۱۲ تریاژ سریع)
- ارزیابی تریاژ روزانه (فرم ۱۳) طبق جدول مندرج در صفحه ۲ « پرسشنامه تریاژ سریع کووید-۱۹ »
- انجام تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ صرفاً جهت افراد دارای علائم مشکوک
- ارزیابی سلامت کارکنان ساکن در کمپ همراه با مستندسازی مراقبت روزانه تحت نظر پرستار با مشارکت افراد آموزش دیده
- ارائه آموزش های فردی لازم به کارکنان (چهره به چهره یا تحویل پمفلت آموزشی) توسط پرستار



- آموزش سرپرست کمپ و مسئول HSE در خصوص اقدامات پیشگیرانه بهداشتی در محل کار و استراحت
- نحوه ایزولاسیون و انتقال کارکنان مشکوک به کووید-۱۹ طبق دستورالعمل قرنطینه در محل کار ( pro 13 )
- تایید موارد مشکوک با بررسی علائم و یا نتیجه مثبت تست سریع آنتی ژن کووید-۱۹ توسط پزشک (مشاوره تلفنی و یا حضوری)
- تعیین وضعیت فرد مشکوک / مثبت شامل " ۱- قرنطینه در محل کار/منزل ، ۲-نیاز به اعزام "
- برنامه ریزی لازم جهت اعزام فرد به خشکی طی هماهنگی با EOC منطقه
- درخواست تست PCR مجدد جهت تایید بیماری پس از اعزام شاغل مشکوک به خشکی



- ایجاد یک اتاق مستقل ایزوله خارج از کمپ جهت اقامت کارکنان مشکوک به کووید-۱۹ ( دستورالعمل PRO-27)
- انتقال کارکنان مشکوک به کووید-۱۹ صرفاً از طریق آمبولانس ویا خودروی شخصی با تجهیزات حفاظتی و یا آمبولانس دریایی (شناور تندرو)
- رعایت اصول محافظت فردی در آمبولانس طبق دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان (انتقال بیمار از طریق پرواز ممنوع است)
- در موارد عدم امکان انتقال ایمن فرد ، بمدت ۱۴ روز در محل اقامت قرنطینه گردد (مراکز خشکی)
- در صورت نیاز به اعزام و یا تشدید علائم بالینی ، انتقال فوری به نزدیکترین بیمارستان
- شناسائی افرادی که در محل کار و یا اقامت فرد مبتلا تماس نزدیک داشته اند و مراقبت و ارزیابی روزانه ایشان و تحویل ماسک حداقل ۱۴ روز
- گندزدایی محل اقامت و کار فرد آلوده
- انجام تست سریع آنتی ژن کووید-۱۹ توسط فرد آموزش دیده طبق دستورالعمل برای افراد در تماس نزدیک
- ارائه گزارش روزانه به EOC منطقه و شرکت مربوطه از وضعیت نتایج ارزیابی سلامت کارکنان سکو

**توصیه های لازم در خصوص انجام تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ در شاغلین سکوهای نفتی**

- توصیه اکید وزارت بهداشت؛ انجام آزمایش تشخیص مولکولی ۴۸-۷۲ ساعت قبل از اعزام کارکنان به منطقه عملیاتی می باشد و افراد می بایست در روز اعزام فاقد علائم بیماری و دارای جواب منفی آزمایش PCR باشند.
- زمانی که امکان دسترسی به تست PCR وجود ندارد می توان از تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ صرفاً جهت افراد دارای علائم مشکوک (غیراختصاصی) استفاده نمود.
- در زمان کار شاغلین در سکوهای نفتی و در مبادی ورودی اعزام به سکوهای نفتی، پس از تکمیل فرم خود اظهاری و تریاژ سریع (فرم شماره ۱۷) جهت افرادی که دارای علائم غیراختصاصی می باشند تست تشخیص سریع آنتی ژن انجام می شود.
- در صورت مثبت شدن تست سریع آنتی ژن، فرد مشکوک فوراً قرنطینه در محل کار شود (pro 13) و طی هماهنگی با EOC منطقه برنامه ریزی لازم جهت اعزام فرد به خشکی، طبق دستورالعمل انجام شود.
- پس از اعزام شاغل مشکوک به خشکی می بایست تست PCR جهت تایید بیماری درخواست گردد.
- در صورت ادامه علائم با وجود منفی شدن تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ ضمن رعایت تمامی دستورالعملهای مربوطه می بایست قرنطینه در محل کار صورت پذیرد و همچنین هر دو روز تست سریع آنتی ژن تکرار گردد (دو نوبت) و در صورتیکه نتیجه تست مثبت شود، برنامه ریزی جهت اعزام به خشکی انجام گردد.
- در صورت وجود علائم اختصاصی کووید و همچنین در افراد مشکوک دارای سابقه تماس نزدیک با فرد مبتلا به کووید (pro 51) اولین اقدام پیش از انجام تست PCR (حتی با نتیجه منفی تست سریع آنتی ژن) قرنطینه فوری در محل کار، برنامه ریزی جهت اعزام شاغل به خارج از سکوهای نفتی و نحوه رفتار مشابه موارد مثبت کووید ۱۹ می باشد.
- هر گونه علائم دیگر که جزء علائم اختصاصی کووید نمی باشد مانند دویینی، گیجی، سرگیجه، کاهش اشتها، خارش و قرمزی پوست و ... را می توان به عنوان علائم غیر اختصاصی در نظر گرفت و تست سریع آنتی ژن کووید ۱۹ انجام داد (علائم اختصاصی شامل: تب، لرز سردرد، تنگی نفس، بدن درد، احساس خستگی و ضعف، احساس سنگینی در قفسه سینه، سرفه، گلودرد، کاهش حس بویایی/چشایی، قرمزی چشم و علائم گوارشی می باشد).