

Pro-31-cov-1

هدف:

انتقال ایمن و به موقع بیماران مشکوک به کووید ۱۹ از مراکز بهداشتی درمانی به سطوح بالاتر
مسئول اجرا: فرمانده صحنه (رئیس بهداشت و درمان / مرکز بهداشتی درمانی/بیمارستان) و یا
مسئول شیفت مرکز (جانشین فرمانده صحنه)

ناظر: کارشناس مسئول EOC منطقه و مدیر شرایط اضطراری (رئیس بهداشت درمان)

افراد واجد شرایط انتقال:

افراد واجد شرایط انتقال به بیمارستان یا مراکز سطح بالاتر برای انجام CXR یا CT scan شامل
وجود علائم ILI به همراه یکی از موارد زیر می باشد:

۱. انجام CT scan در گروه پر خطر
۲. وجود علائم بالینی کووید-۱۹ که نیاز به ارجاع فوری به بیمارستان دارد ($PO_2 > 93\%$) ، کاهش سطح هوشیاری ، تنگی نفس یا تنفس دشوار و.. (بر اساس آخرین دستورالعمل فلوجارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ ابلاغی از وزارت بهداشت و درمان)
۳. وجود اینفیلتراسیون در ریه ها در مدارکی مانند CT scan یا CXR
۴. به درمان دو دارویی و استراحت در منزل پاسخ نداده و علائم شدت پیدا کرده باشد.
۵. وجود علائم هشدار دهنده در فردی که در قرنطینه می باشد(بر اساس آخرین دستورالعمل فلوجارت تشخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ ابلاغی از وزارت بهداشت و درمان)

نحوه مدیریت انتقال بیمار به سطوح بالاتر درمانی از مراکز بهداشتی و درمانی

مناطق عملیاتی / غیر عملیاتی و یا واحدهای قرنطینه در محل کار یا منزل

روش اجراء:

الف - در مرکز بهداشتی و درمانی (عملیاتی یا غیر عملیاتی):

۱. در انتقال بیمار شاغل در سکو ها از دستورالعمل **pr-13 cov-1** تبعیت گردد
 ۲. در مراکز بهداشتی و درمانی ، بیمار در اتاق ایزوله تا زمان انتقال به سطح بالاتر با رعایت موازین حفاظتی (داشتن ماسک، حداقل ۱/۵ متر فاصله از دیگران، تهویه مناسب و ..) نگهداری شود.
 ۳. رئیس مرکز بهداشتی درمانی به عنوان فرمانده صحنه (رئیس سلامت خانواده، رئیس مرکز عملیاتی یا غیر عملیاتی ، سرپرستار و ..) با سطح بالاتر جهت انتقال بیمار / ارجاع به (بیمارستان و بخش **CT scan** و ...) هماهنگ می نماید.
 ۴. فرم ارجاع بیمار توسط پزشک معالج مرکز (سلامت کار و یا خانواده) تکمیل می گردد
 ۵. پس از کسب اخذ موافقت سوپروایزر مقصد ، آمبولانس استاندارد تایپ **B** با شرایط لازم جهت انتقال بیمار مشکوک به ابتلا به کووید ۱۹ (طبق دستورالعمل خدمات اورژانس ابلاغی وزارت بهداشت و درمان) به سطح بالاتر ارجاع گردد
 ۶. پس از اتمام ماموریت تمهیدات لازم برای گندزدایی و ضد عفونی آمبولانس طبق دستورالعمل ابلاغی فراهم باشد و پس از ضد عفونی آمبولانس از دستکش، ماسک و دیگر وسایل حفاظت فردی به تناسب امکانات منطقه تعویض شود.
 ۷. با توجه به اینکه این بیماران نیاز به اسکورت طبی دارند ، ضروریست کلیه پرسنل آمبولانس طبق دستورالعمل مجهز به لوازم حفاظت فردی کامل باشند
- ب- انتقال افراد کاندید قرنطینه در منزل یا محل کار :

نحوه مدیریت انتقال بیمار به سطوح بالاتر درمانی از مراکز بهداشتی و درمانی

مناطق عملیاتی / غیر عملیاتی و یا واحدهای قرنطینه در محل کار یا منزل

۱. مراقب سلامت واحد call center ابتدا به بیمار توصیه می نماید تا زمان فراهم شدن انتقال به سطح بالاتر، موازین حفاظتی (داشتن ماسک، حداقل ۱/۵ متر فاصله از دیگران، تهویه مناسب و ..) را رعایت و از ارتباط با سایر افراد همجوار پیشگیری نماید
۲. مراقب سلامت واحد call center با ۱۱۵ منطقه و رئیس مرکز بهداشتی درمانی به عنوان فرمانده صحنه (رئیس سلامت خانواده، رئیس مرکز عملیاتی یا غیر عملیاتی، سرپرستار و ..) جهت انتقال به سطح بالاتر (متناسب با شرایط منطقه بیمارستان صنعت نفت یا بیمارستان معین) هماهنگ نماید.

پیگیری:

۱. لازم است پزشک معالج مرکز سلامت کار و خانواده به صورت تلفنی وضعیت بیمار را پیگیری در صورت نیاز به مداخله جهت تسهیل و یا راهنمایی خاص، اقدام لازم انجام دهند.
۲. فرمانده صحنه (رئیس مرکز بهداشتی درمانی) به صورت روزانه لیست افراد اعزامی را به EOC منطقه اعلام نماید.
۳. EOC منطقه نتیجه را به مراقب سلامت واحد call center را اعلام تا مناسب با شرایط فرد اقدام مناسب را انجام دهد (دستورالعمل Pro 31-cov-1)
۴. در صورت مثبت بودن ارزیابی ها و محتمل بودن تشخیص، اطلاعات فرد از طریق EOC منطقه در قالب فرم A1 به EOC ستاد سازمان اعلام گردد.

98/12/10